

Espaces vectoriels de dimension finie

Exercice 1.

Soient $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts ($n \geq 1$). Notons $\mathcal{B} = (e_0, e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de \mathbb{K}^{n+1} ($e_0 = (1, 0, \dots, 0), e_1 = (0, 1, \dots, 0), \dots$).

On considère l'application $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$ définie par $\varphi(P) = (P(x_0), P(x_1), \dots, P(x_n))$.

1. Justifier que f est une application linéaire.
2. Déterminer $\ker \varphi$, en déduire que φ est un isomorphisme.
3. Montrer que pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$, il existe un unique polynôme $L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\varphi(L_i) = e_i$. On déterminera une expression de L_i .
Les L_i s'appellent les polynôme de Lagrange.
4. Justifier que $L := (L_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
5. Calculer les coordonnées d'un polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans la base L .

Exercice 2.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts, pour $1 \leq i \leq n$, on note v_i le vecteur $v_i = (\lambda_1^{i-1}, \dots, \lambda_n^{i-1})$ élément de \mathbb{K}^n .

Montrer que la famille $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de \mathbb{K}^n .

Exercice 3.

Soit E un ev de dimension n . F et G deux sev de E . Montrer que si $\dim F + \dim G > n$ alors $F \cap G \neq \{0\}$

Exercice 4.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (x - y, z - y, x - y)$

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$
2. Déterminer une base du $\ker f$ et une base de $\text{Im } f$. Vérifier que $\ker f$ et $\text{Im } f$ ne forme pas une somme directe.

Exercice 5.

Soit $a \in \mathbb{K}$. Montrer que la famille $((X - a)^i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Donner les composantes de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.

Exercice 6.

Soit E un ev de dimension finie, f et g deux endomorphisme de E tels que $E = \text{Im } f + \text{Im } g = \text{ker } f + \text{ker } g$.
Montrer que ces sommes sont directes.

Exercice 7.

Soit E un ev de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose :

$K_n = \text{ker } f^n$ et $I_n = \text{Im } f^n$

1. Montrer que la suite $(K_n)_n$ est croissante et que $(I_n)_n$ est décroissante au sens de l'inclusion.
2. Montrer que ces deux suites sont stationnaires et que si $p = \min\{i / K_i = K_{i+1}\}$ alors $p = \min\{i / I_i = I_{i+1}\}$
3. Montrer que $E = K_p \oplus I_p$
4. Montrer que $f(I_p) \subseteq I_p$, et que l'endomorphisme induit par f sur I_p est un automorphisme.

Exercice 8.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que
 $f^3 = -f$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{ker } f \oplus \text{Im } f$

Exercice 9.

Soit E un ev de dimension n . Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f + g$ est injectif et $\text{Im } g \subset \text{ker } f$

1. Montrer que $rg(f) + rg(g) = n$
2. En déduire que $\text{ker } f = \text{Im } g$

Exercice 10.

Soit E un \mathbb{C} ev de dimension n . Montrer que E est de dimension $2n$ en tant que \mathbb{R} espace vectoriel.

Exercice 11.

Soit E un ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que pour tout $x \in E$, il existe un entier $n_x \in \mathbb{N}$ tel que $f^{n_x}(x) = 0$.

Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$, tel que $f^n = 0$

Exercice 12.

Soit E un ev de dimension finie.
Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\ker f = \text{Im } f$ si, et seulement si, E est de dimension paire.

Exercice 13.

Soit E un ev de dimension finie n . et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ Montrer que
 $|rg(f) - rg(g)| \leq rg(f+g) \leq rg(f) + rg(g)$

Exercice 14.

Soit E un ev de dimension finie n . et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ Montrer que
 $rg(f) + rg(g) = rg(f+g)$ si, et seulement si, $\text{Im } f \cap \text{Im } g = \{0\}$ et $\ker f + \ker g = E$

Exercice 15.

Soit E un ev de dimension n , et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$

1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E
2. On pose $H = \{g \in \mathcal{L}(E), gf = fg\}$
 - 2.1 Montrer que H est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$
 - 2.2 Montrer que $\dim H = n$.
Ind : Montrer que $(\text{Id}, f, \dots, f^{n-1})$ est une base de H

Exercice 16.

Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts.

Montrer qu'ils existent $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$, $\int_0^1 P(t) dt = \sum_{i=0}^n \lambda_i P(x_i)$.

Exercice 17.

Soit E un ev de dimension $n \geq 2$. Montrer que l'intersection de deux hyperplans distincts de E est un sev de dimension $n - 2$

Exercice 18.

Soient E un ev de dimension finie, f et g deux formes linéaires non nulles sur E .
Montrer que $\ker f = \ker g$ si, et seulement si, la famille (f, g) est liée.

Exercice 19.

Soient E un \mathbb{K} ev de dimension $n \geq 1$ et F un sev de E distinct de E de dimension d .
Montrer que F est l'intersection de $n - d$ hyperplans de E

Exercice 20.

Soient E un \mathbb{K} ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ Montrer que :

$$\ker f = \text{Im } f \Leftrightarrow f^2 = 0 \text{ et } \dim E = 2rg(f)$$

Exercice 21.

Soient E un \mathbb{K} ev, F un sev de E et $f \in \mathcal{L}(E)$

1. Montrer que si $F \subset f(F)$ et F de dimension finie alors $f(F) = F$
2. Le résultat reste t-il vrai si F n'est pas de dimension finie ?

Exercice 22.

Soit E un espace vectoriel de dimension 3, et f un endomorphisme de non nul de E .

1. Quelles sont les valeurs possibles du rang de f ?
2. On suppose dans cette question que $f^2 = 0$, déterminer le rang f .
3. On suppose dans cette question que $f^3 = 0$ et $f^2 \neq 0$. Déterminer le rang de f .